

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年9月24日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号 | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 第20889号 | ベンレート水和剤 | ベノミル水和剤 | 住友化学（株） |
| 第23180号 | G F ベンレート水和剤 | ベノミル水和剤 | 住友化学園芸（株） |

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回、使用制限となる変更部分のみ）】

- ・作物名「小麦」（※）の適用病害虫名「赤かび病」の本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・作物名「えんどうまめ」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」に変更する。
- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」の本剤の使用回数およびベノミルを含む農薬の総使用回数を「4回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」の適用病害虫名「そうか病」、「灰色かび病」を削除する。

【適用表（今回、使用制限となる変更部分のみ）】

【変更前】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 または 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | ベノミル を含む 農薬の 総使用回数 |
|----------------------|---|--------------------|------------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------|
| 小麦（※） | 赤かび病 | 2000～3000 倍 | 60～ 150L/10a | 収穫7日前 まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） |
| | 雪腐病 | | | 根雪前 | 1回 | | |
| えんどうまめ | 菌核病 褐紋病 | 1000～2000 倍 | 100～300 L/10a | 収穫7日前 まで | 4回以内 | | 5回以内 （種子粉衣は 1回以内、は種 後は4回以内） |
| かんきつ （みかん を除く） | そうか病 灰色かび病 | 2000～3000 倍 | 200～700 L/10a | 収穫7日前 まで | 4回以内 | | 4回以内 |
| | 貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病） 貯蔵病害（軸腐病） 貯蔵病害（炭疽病） 貯蔵病害（黒斑病） | 4000～6000 倍 | | | | | |

【 変更後 】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 または 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | ベニミル を含む 農薬の 総使用回数 |
|----------------------|---|--------------------|------------------|----------------------|-------------|------|--|
| 小麦 (※) | 赤かび病 | 2000～3000 倍 | 60～ 150L/10a | 収穫7日前 まで | <u>2回以内</u> | 散布 | 4回以内（種子へ の処理は1回以 内、は種後は3回 以内） |
| | 雪腐病 | | | 根雪前 | 1回 | | |
| えんどうまめ | 菌核病 褐紋病 | 1000～2000 倍 | 100～300 L/10a | <u>収穫14日 前まで</u> | 4回以内 | | 5回以内 （種子粉衣は 1回以内、は種 後は4回以内） |
| かんきつ （みかん を除く） | 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(黒斑病) | 4000～6000 倍 | 200～700 L/10a | 収穫前日ま で | <u>2回以内</u> | 2回以内 | |

※ GFベンレート水和剤（第23180号）は、小麦への適用がないため、小麦に係る変更はない。

【 変更理由 】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。