

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20939号	ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	全国農業協同組合連合会
第21904号	スミフェート粒剤	アセフェート粒剤	住友化学株式会社
第20967号	ジェイエース水溶剤	アセフェート水溶剤	全国農業協同組合連合会
第21903号	スミフェート水溶剤	アセフェート水溶剤	住友化学株式会社

■変更内容及び変更理由

1) アセフェート粒剤（第20939号 ジェイエース粒剤、第21904号 スミフェート粒剤）

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ① 作物名「キャベツ」の「適用病害虫名」、「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「ハイマダラノメイガ」を削除し、「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期葉面散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ② 作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ③ 作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫14日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「株元散布」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」に、及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑤ 作物名「かぶ」の「使用時期」及び「使用方法」をそれぞれ「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に、及び「生育期葉面散布」から「株元散布」に変更する。
- ⑥ 作物名「なばな」の「使用方法」を「定植時土壌混和处理」から「土壌混和处理」に変更する。
- ⑦ 作物名「きゅうり、トマト、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫前日まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑧ 作物名「ミニトマト」を削除する。

- ⑨ 作物名「みずな」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に、及び「2回以内（定植時は1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑩ 作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ⑪ 作物名「こまつな」の「使用方法」を「は種前作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。
- ⑫ 作物名「チンゲンサイ」の「使用方法」を「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。

2) アセフェート水溶剤

(第 20967 号 ジェイエース水溶剤、第 21903 号 スミフェート水溶剤)

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- ① 作物名「かんきつ」を削除する。
- ② 作物名「かき」の「希釈倍数」を「1000～1500倍」から「1500倍」に変更する。
- ③ 作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫30日前まで」から「収穫60日前まで」に、「2回以内」から「1回」に、及び「2回以内」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」に、「3回以内」から「1回」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ⑤ 作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000～1500倍」から「1500倍」に、「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に、「3回以内」から「1回」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑥ 作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に変更する。
- ⑦ 作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑧ 作物名「だいこん」を削除する。
- ⑨ 作物名「かぶ」を削除する。
- ⑩ 作物名「チンゲンサイ」の「希釈倍数」を「1000倍」から「1500倍」に変更する。
- ⑪ 作物名「みずな」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000倍」から「1500倍」に、「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に、「2回以内」から「1回」及び「2回以内（定植時は1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑫ 作物名「トマト」、「ミニトマト」及び「なす」を削除する。
- ⑬ 作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫3日前まで」から「収穫開始7日前まで」に変更する。
- ⑭ 作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総

使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」に、「4回以内」から「2回以内」に、及び「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。

- ⑮ 作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採30日前まで」から「摘採45日前まで」に、「2回以内」から「1回」に、及び「2回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第 20939 号 ジェイエース粒剤、第 21904 号 スミフェート粒剤）

[変更前]

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ コガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当り 1～2g)	定植時及び生育期 但し、 収穫 21 日前まで	3 回 以内	定植時植穴処理 及び 生育期葉面散布	3 回以内
	ハイマダラノメイガ		収穫 21 日前まで		生育期葉面散布	
はくさい	アオムシ コガ ヨトウムシ アブラムシ類		定植時及び生育期 但し、 収穫 21 日前まで			
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (1株当り 2g)	定植時及び生育期 但し、 収穫 14 日前まで			
だいこん	アオムシ コガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	1 回	は種前作条散布	2 回以内 (は種前及び は種時の 処理は 合計 1 回以内)
かぶ		4kg/10a	収穫 14 日前まで			生育期葉面散布
なばな	アブラムシ類	6kg/10a (1株当り 2g)	定植時		定植時土壌混和 処理	1 回
きゅうり	オンシツコナジラミ アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当り 1～2g)	定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	3 回 以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
トマト						
ミニトマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ			定植時	1 回	定植時作条散布 又は 植穴散布
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類		定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	3 回 以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
みずな		6kg/10a	定植時	1回	定植時作条散布 後土壌混和	2回以内 (定植時は 1回以内)
ばれいしょ	アブラムシ類	3～6kg/10a	植付時		作条散布	5回以内 (植付時の処理 は1回以内、 植付後は 4回以内)
こまつな			は種前		は種前作条 散布後土壌混和	1回
チンゲンサイ			定植時		定植時作条 散布後土壌混和	

[変更後]

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アセフトを 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ コガ ヨウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1株当り 1~2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 1回以内)
はくさい						
ブロッコリー	ヨウムシ	6kg/10a (1株当り 2g)			株元散布	1回
だいこん	アオムシ コガ アブラムシ類	3~4kg/10a	は種前		作条散布	
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 21 日 前まで		株元散布	
なばな		6kg/10a (1株当り 2g)			土壌混和処理	
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 アザミウマ類	3~6kg/10a (1株当り 1~2g)	定植時		作条散布 又は 植穴処理	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ					
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類					
みずな		6kg/10a			作条散布後 土壌混和	
ばれいしょ	アブラムシ類	3~6kg/10a	植付時	作条散布	3回以内 (植付時の処理は 1回以内、 植付後は 2回以内)	
こまつな			は種前	作条散布後 土壌混和	1回	
チンゲンサイ			定植時			

2) アセフェート水溶剤

(第 20967 号 ジェイエース水溶剤、第 21903 号 スミフェート水溶剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ヤノネカゲラムシ ツノロウムシ ルビノロウムシ ミカンキイロアザミウマ アザミウマ類	1000 倍	200~700 L/10a	収穫 30 日前 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
	コアオハナムケリ チャノキイロアザミウマ アブラムシ類 ケシキスイ類	1000~ 1500 倍					
	ミカントゲコジラミ	1500 倍					
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハナムシカ	1000~ 1500 倍	200~700 L/10a	収穫 45 日前 まで	2 回 以内		2 回以内
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500~ 2000 倍		収穫 30 日前 まで			
キャベツ	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 タマキニンワバ	1000~ 1500 倍	100~300 L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内		3 回以内
	はくさい			ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類			
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内		2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)
ブロッコリー	ヨトウムシ						
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1500~ 2000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)	
	かぶ	アオムシ コナガ アブラムシ類		1500~ 2000 倍			収穫 21 日前 まで
チンゲンサイ	アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	2 回以内 (定植時は 1 回以内)	
みずな				1000~ 2000 倍	3 回 以内	3 回以内	
トマト				ママホモケリハエ オオタバコガ	1000 倍	収穫前日 まで	3 回 以内

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
ミニトマト	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	1回	散布	2回以内 (定植時の処理は1回以内、定植後は1回以内)	
	マメハモグサリハエ オオタバコガ	1000倍						
なす	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
	ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	1000倍						
オクラ	アブラムシ類 フタテノミト リヒメヨコハエ			1000倍	収穫3日前まで			1回
ばれいしょ	ヨトウムシ オオニシユウヤホシテントウ	1000～2000倍 300倍			25L/10a			収穫7日前まで
	アブラムシ類							
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコハエ	1000～2000倍	200～400 L/10a	摘採30日前まで	2回以内	2回以内		
	チャノコカモンハマキ	1000～1500倍						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフトを含む農薬の総使用回数
かき	カキタ ^{アサミウマ} チャノキイ ^{アサミウマ} カキノハムシ ^ガ	1500倍	200～700 L/10a	収穫45日前 まで	2回 以内	散布	2回以内
ぶどう	チャノキイ ^{アサミウマ} フタテンヒメヨコ ^{バイ}	1500～ 2000倍		収穫60日前 まで	1回		1回
キャベツ	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ^ガ ヨトウムシ アブラムシ類 タナキ ^{ソウワバ}	1000～ 1500倍	100～300 L/10a	収穫30日前 まで			1回
はくさい	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ^ガ ヨトウムシ アブラムシ類	1500倍			1回		
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オタハ ^{コガ}	1000～ 1500倍 1000倍			3回 以内		3回以内
チンゲンサイ みずな	アブラムシ類	1500倍	1000倍	収穫21日前 まで	1回		1回
オクラ	アブラムシ類 フタテンミ ^{トリヒメヨコ} バイ	1000～ 2000倍 300倍		収穫開始7日 前まで			
ばれいしょ	ヨトウムシ オオニジ ^{ユウヤホシテント} ウ		1000～ 2000倍 300倍	25L/10a	収穫30日前 まで	2回 以内	3回以内 (植付時の処理は 1回以内、植付後は 2回以内)
	アブラムシ類						
茶	チャノキイ ^{アサミウマ} チャノミ ^{トリヒメヨコ} バイ	1000～ 2000倍	200～400 L/10a	摘採45日前 まで	1回	1回	
	チャノコカクモンハマキ	1000～ 1500倍					

【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は1日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。