

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成27年2月4日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第4803号	住化ジメトエート乳剤	ジメトエート乳剤	住友化学（株）
第12406号	サンケイジメトエート乳剤	ジメトエート乳剤	琉球産経（株）
第14397号	ジメトエート粒剤	ジメトエート粒剤	住友化学（株）
第22733号	ホクサンジメトエート粒剤	ジメトエート粒剤	ホクサン（株）
第15450号	ベジホン乳剤	ジメトエート・フェンバレレート乳剤	住友化学（株）
第22630号	ホクサンベジホン乳剤	ジメトエート・フェンバレレート乳剤	ホクサン（株）

■変更内容及び変更理由

1) ジメトエート乳剤

（第4803号 住化ジメトエート乳剤、第12406号 サンケイジメトエート乳剤）

【変更内容（今回、使用制限となる変更部分のみ）】

- ・作物名「みかん」、「なつみかん」、「かんきつ（みかん、なつみかんを除く）」、「はくさい」、「トマト」、「ピーマン」、「かぼちゃ」、「しろうり」、「かぶ」、「にんじん」、「ねぎ」、「にら」、「たまねぎ」、「さやいんげん」、「さとうきび」^{※1}及び「パイナップル」^{※1}を削除する。

※1：サンケイジメトエート乳剤（第12406号）のみに適用有り。

2) ジメトエート粒剤

（第14397号 ジメトエート粒剤、第22733号 ホクサンジメトエート粒剤）

【変更内容（今回、使用制限となる変更部分のみ）】

- ・作物名「だいこん」、「なす」、「ねぎ」、「だいず」、「畑わさび」及び「わさび」を削除する。

3) ジメトエート・フェンバレレート乳剤

（第15450号 ベジホン乳剤、第22630号 ホクサンベジホン乳剤）

【変更内容（今回、使用制限となる変更部分のみ）】

- ・作物名「キャベツ」、「はくさい」及び「だいこん」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

1) ジメトエート乳剤

（第4803号 住化ジメトエート乳剤、第12406号 サンケイジメトエート乳剤）

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトエートを含む農薬の総使用回数
みかん	ヤノネカイラムシ	800～1000倍	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ミカンハモグリガ	800～1500倍				
	ミカンコナジラミ コナカイラムシ類	1000～1500倍				
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～2000倍				
	カネタキ ゴマダラカミキリ成虫 ミカンハエ	1000倍				
なつみかん	ヤノネカイラムシ	800～1000倍	収穫90日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ミカンハモグリガ	800～1500倍				
	ミカンコナジラミ コナカイラムシ類	1000～1500倍				
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～2000倍				
	カネタキ ゴマダラカミキリ成虫 ミカンハエ	1000倍				
かんきつ (みかん、 なつみかん を除く)	ミカンハモグリガ ミカンコナジラミ コナカイラムシ類	1000～1500倍	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～2000倍				
	カネタキ ゴマダラカミキリ成虫 ヤノネカイラムシ ミカンハエ	1000倍				
はくさい	アブラムシ類	2000倍	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
トマト	ハダニ類 アブラムシ類	1000～2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ピーマン かぼちゃ しろうり			収穫7日前まで			
かぶ			アブラムシ類	2000倍		収穫14日前まで
にんじん	収穫7日前まで					
ねぎ	収穫30日前まで					
にら	収穫14日前まで					
たまねぎ	1000～2000倍	収穫7日前まで			4回以内	4回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトエトを含む農薬の総使用回数
さやいんげん	インゲンモグリハエ	1000倍	発芽後～ 本葉2～3葉期	3回以内	散布	3回以内
さとうきび※1	タカラマルカイガラムシ カンシャワタアブラムシ		収穫21日前まで	4回以内		4回以内
パイナップル※1	パイナップルコナカイガラムシ					

※1：サンケイジメトエート乳剤（第12406号）のみに適用有り。

[変更後]

（削除）

2) ジメトエート粒剤

（第14397号 ジメトエート粒剤、第22733号 ホクサンジメトエート粒剤）

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトエトを含む農薬の総使用回数
だいこん	アブラムシ類	3～6kg/10a	は種前～ 収穫42日前 まで	3回以内	株元施用 又は 作条施用	3回以内
なす	ハダニ類 モモアカアブラムシ テントウムシダマシ アザミウマ類		定植後 収穫14日前 まで		株元施用	
ねぎ	アザミウマ類 ネダニ ネキハモグリハエ		移植前～ 収穫30日前 まで		作条施用	
だいず	アブラムシ類	3～6kg/10a	は種時	1回		1回
畑わさび	ワサビクダアザミウマ ミドリサルゾウムシ	6kg/10a	収穫28日前 まで	2回以内	散布	2回以内
わさび			畑育苗期			

[変更後]

（削除）

3) ジメトエート・フェンバレート乳剤

(第 15450 号 ヘキシホン乳剤、第 22630 号 ホクサンヘキシホン乳剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトエートを含む農薬の総使用回数	フェンバレートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コカガ アブラムシ類 ヨトウムシ タナギンウハバ	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内
はくさい	アオムシ コカガ			収穫14日 前まで				
だいこん	アブラムシ類 ヨトウムシ			収穫35日 前まで				3回以内

[変更後]

(削除)

【変更理由】

- ① みかん、なつみかん、かんきつ（みかん、なつみかんを除く）、はくさい、トマト、ピーマン、かぼちゃ、しろうり、かぶ、にんじん、ねぎ、にら、たまねぎ、さやいんげん、パイナップル、だいこん、なす、だいず、キャベツ

(変更理由) ジメトエートを有効成分とする農薬は、これまで有効成分ジメトエートのみの評価に基づき農薬登録が行われていたが、今後、改めて評価される場合は、ジメトエートの代謝物であるオメトエートが評価の対象になると想定され、農薬製造者がこのことを考慮して自ら短期暴露評価を実施した結果、現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要することから、使用制限となる登録変更が必要であると考えられたため。

- ② さとうきび、畑わさび、わさび

(変更理由) 短期暴露評価の対象となる食品ではないが、現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。